

消化器がん化学療法即戦マニュアル（第2版 第1刷） 正誤表

このたびはご購入いただきまして誠に有難うございます。本書に誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正させていただきます。

訂正箇所	p.69 [投与計画] 中のカペシタビンの投与量・投与方法
誤	1,000mg/m ² /回 経口 2回/day 朝夕, 14日間連続 1.36m ² 未満 : 1,200mg (4錠) /day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 : 1,500mg (5錠) /day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 : 1,800mg (6錠) /day 1.96m ² 以上 : 2,100mg (7錠) /day
正	1,000mg/m ² /回 経口, 2回/day, 朝夕, 14日間連日 1.36m ² 未満 : 1,200mg (4錠) /回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 : 1,500mg (5錠) /回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 : 1,800mg (6錠) /回 1.96m ² 以上 : 2,100mg (7錠) /回

訂正箇所	p.70 [投与計画] 中のカペシタビンの投与量・投与方法
誤	1,000mg/m ² /day 経口 2回/day 朝夕14日間毎日 1.36m ² 未満 : 1,200mg (4錠) /day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 : 1,500mg (5錠) /day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 : 1,800mg (6錠) /day 1.96m ² 以上 : 2,100mg (7錠) /day
正	1,000mg/m ² /回 経口, 2回/day, 朝夕, 14日間連日 1.36m ² 未満 : 1,200mg (4錠) /回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 : 1,500mg (5錠) /回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 : 1,800mg (6錠) /回 1.96m ² 以上 : 2,100mg (7錠) /回